

Диагностика отдельных заболеваний, передающихся половым путем

В следующих клиниках проводится конфиденциальное консультирование и диагностика ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающиеся половым путем (ЗППП). Квалифицированный персонал клиник ответит на вопросы о ВИЧ и ЗППП, а также предоставит направления к компетентным и внимательным поставщикам медицинских и психиатрических услуг.

МИННЕАПОЛИС

Hennepin County

Public Health Clinic

(Formerly Red Door)

525 Portland Avenue

Minneapolis, MN 55415

(612) 543-5555

(612) 348-4729 TTY

www.co.hennepin.mn.us

СЕНТ-ПОЛ

St. Paul-Ramsey County

Department of Public

Health

Room 111

555 Cedar Street

St. Paul, MN 55101

(651) 266-1352

www.co.ramsey.mn.us/ph

В штате Миннесота существует много других центров, где можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию и ЗППП. В данной брошюре не хватает места для того, чтобы перечислить все центры. Чтобы узнать о центрах, где можно пройти диагностику ВИЧ, позвоните на горячую линию AIDSLine Проекта штата Миннесота по борьбе со СПИДом (MAP AIDSLine); чтобы узнать о центрах, где можно пройти обследование на выявление ЗППП, позвоните на горячую линию штата Миннесота по вопросам планирования семьи и ЗППП (см. ниже).

Горячая линия Проекта штата Миннесота по борьбе со СПИДом (Minnesota AIDS Project AIDSLine)

Для жителей муниципального района:

(612) 373-AIDS

Линия TTY: (612) 373-2465

Для жителей штата:

1-800-248-AIDS

Линия TTY: 1-888-820-2437

<http://www.mnaidsproject.org>

Горячая линия штата Миннесота по вопросам планирования семьи и ЗППП (Minnesota Family Planning and STD Hotline)

Голосовая линия/линия TTY: 1-800-783-2287

Для жителей муниципального района:

(651) 645-9360

<http://www.sexualhealthmn.org>

Дополнительная информация

Если у вас возникнут проблемы или вопросы, касающиеся ЗППП, вы можете обратиться к своему врачу, сотрудникам больницы или в местный отдел здравоохранения. Для получения дополнительной информации об обследованиях обратитесь в одну из клиник, указанных в предыдущей колонке, или к другим источникам информации, приведенным ниже.

Если у вас есть особые проблемы, связанные с сексуальным насилием, обратитесь в местный центр помощи жертвам сексуального насилия. Сотрудники центра предоставят вам информацию, направления к специалистам и поддержку.

Обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту за медицинской консультацией, если вы подозреваете, что у вас был контакт с больным ЗППП.

Для получения информации о ЗППП звоните на
Горячую линию штата Миннесота по вопросам планирования семьи и ЗППП (Minnesota Family Planning and STD Hotline)

Голосовая линия/линия TTY (для лиц с нарушением слуха):
1-800-783-2287

Для жителей муниципального района: (651) 645-9360
<http://www.sexualhealthmn.org>

Горячая линия Проекта штата Миннесота по борьбе со СПИДом (Minnesota AIDS Project AIDSLine)

Для жителей муниципального района:

(612) 373-AIDS

Линия TTY: (612) 373-2465

Для жителей штата:

1-800-248-AIDS

Линия TTY: 1-888-820-2437

<http://www.mnaidsproject.org>

Департамент здравоохранения штата Миннесота (Minnesota Department of Health)

Служба эпидемиологии, профилактики и контроля
инфекционных заболеваний

Отдел профилактики ЗППП и ВИЧ

(651) 201-5414

<http://www.health.state.mn.us/std>

Коалиция противодействия сексуальному насилию штата Миннесота (Minnesota Coalition Against Sexual Assault)

Для жителей муниципального района: (651) 209-9993

Для жителей штата: 1-800-964-8847

<http://www.mncasa.org>

Если вы хотите получить настоящий документ в другом формате
(напечатанный крупным шрифтом,
шрифтом Брайля или записанный на пленку), позвоните по тел.:
(651) 201-5414

Линия TTY: (651) 201-5797

IC #141-0650

For Persons Who Have Been Sexually Assaulted - Russian

4/11

Для лиц, подвергшихся сексуальному насилию

*Информация о заболеваниях,
передающихся половым путем,
которую следует знать*



Служба эпидемиологии, профилактики и контроля
инфекционных заболеваний
Отдел профилактики ЗППП и ВИЧ

Введение

У людей, подвергшихся сексуальному насилию, возникают различные проблемы и вопросы. В настоящей брошюре предоставлена информация о заболеваниях, передающихся половым путем, или ЗППП.

Если данная информация вам непонятна или вы хотели бы получить дополнительную информацию, обратитесь к своему врачу или поставщику медицинских услуг.

Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)

ЗППП можно заразиться при вагинальном, оральном или ректальном контакте с инфицированным лицом. Наиболее распространенными бактериальными ЗППП являются хламидиоз, гонорея и сифилис. Самыми серьезными вирусными ЗППП являются вирус иммунодефицита человека (ВИЧ, вирус, вызывающий СПИД), гепатит В, генитальный герпес и остроконечные кондиломы.

Некоторые из этих ЗППП вызывают серьезные осложнения. Например, при отсутствии лечения гонорея и хламидиоз могут привести к повреждению репродуктивных органов и, как следствие, к выкидышу или бесплодию, как женскому, так и мужскому. Некоторые вирусные ЗППП, например ВИЧ-инфекция, могут привести к серьезным, угрожающим жизни состояниям. Некоторые ЗППП также могут передаваться от беременной женщины плоду.

Риск заражения ЗППП

в результате сексуального насилия

К ЗППП, которые чаще всего диагностируются после сексуального насилия, относятся гонорея и хламидиоз. Риск заразиться гонореей или хламидиозом в результате сексуального насилия невысок. Вероятность заражения сифилисом или генитальным герпесом еще меньше. Риск заражения ВИЧ ничтожно мал, а при сексуальном насилии, связанном только с оральным сексом, он еще ниже.

Если ЗППП было диагностировано после сексуального насилия, это не всегда означает, что инфицирование произошло во время сексуального насилия. Однако обследование после насилия позволяет обнаружить не выявленные ранее ЗППП и назначить лечение. Например, человек может иметь ЗППП (не зная об этом) до сексуального насилия. Это происходит, потому что хламидиоз протекает бессимптомно у 3 из 4 женщин и у 1 из 2 мужчин. Раннее лечение может предотвратить длительное расстройство здоровья.

Признаки и симптомы ЗППП

Некоторые ЗППП вызывают такие симптомы, как зуд, боль, выделения, кровотечение, генитальные язвы или боль в нижней части живота. Эти симптомы могут развиваться в течение нескольких дней, недель и более длительного срока после заражения. Однако нельзя полагаться на данные симптомы для определения факта заражения. Многие люди с ЗППП не имеют никаких симптомов. Поэтому очень важно обратиться к врачу и пройти обследование для выявления ЗППП, чтобы узнать, заразились ли вы в результате сексуального насилия, даже если у вас нет никаких симптомов.

Диагностика и лечение ЗППП после сексуального насилия

После того как вы подверглись сексуальному насилию, важно как можно быстрее пройти обследование, подтверждающее факт сексуального насилия. Если вы обратитесь за медицинской помощью в течение 72 часов после насилия, врач, к которому вы обратитесь, может назначить вам лекарства для лечения определенных ЗППП в случае опасности заражения во время сексуального насилия. В связи с тем, что данные препараты не являются на 100 % эффективными для профилактики заболеваний, важно, чтобы вы знали, какие симптомы могут появиться, и пришли на прием к врачу через две-три недели, чтобы убедиться, что лечение является эффективным. Для предотвращения риска заражения ВИЧ-инфекцией вам может быть предложена постконтактная профилактика (ПКП), которая подразумевает прием антиретровирусных препаратов, если насилие имело место в течение 72 часов до медицинского обследования.

Если у вас нет врача, на обороте данной брошюры перечислены несколько государственных клиник, в которых на условиях конфиденциальности проводится диагностика ВИЧ-инфекции и других ЗППП у жертв сексуального насилия, а также всех, кто может быть инфицирован.

Для лечения гонореи, хламидиоза и сифилиса существуют безопасные эффективные средства. Лечение антибиотиками обычно проводится на основании результатов обследования на наличие ЗППП. Однако ваш врач может принять решение начать лечение до получения результатов обследования.

Предотвращение передачи ЗППП половым партнерам

Если вы были заражены во время сексуального насилия, вы можете передать ЗППП своему партнеру. Поэтому мы рекомендуем вам не иметь сексуальных контактов до получения результатов контрольных анализов спустя две-три недели после того, как вы подверглись насилию.

Если вы все-таки занимаетесь оральным, анальным или вагинальным сексом, важно использовать латексные презервативы или другие барьерные методы контрацепции. Латексные презервативы, используемые постоянно и правильно, являются высокоэффективным методом предотвращения передачи ВИЧ-инфекции. Кроме того, использование латексных презервативов может уменьшить риск заражения другими ЗППП.

ВИЧ/СПИД и сексуальное насилие

Заразиться ВИЧ нелегко. Риск заражения при единичном сексуальном контакте очень небольшой. Проникновение полового члена в вагину или анус или контакт с кровью — наиболее вероятные способы передачи ВИЧ-инфекции во время сексуального насилия. Во время орального секса риск заражения незначительный, но он существует.

Диагностика ВИЧ-инфекции проводится с помощью анализа крови. Сразу после сексуального насилия обратитесь к врачу и сдайте анализы. Вам будут назначены повторные анализы с различными интервалами в течение 6 (шесть) месяцев. Если анализ будет отрицательным спустя 6 (шесть) месяцев, можете быть уверены, что заражение ВИЧ-инфекцией не произошло.

Обследование лиц, совершивших насилие

Согласно законодательству штата Миннесота (закон штата Миннесота 611A.19) суд может потребовать проведения обследования на антитела к ВИЧ после признания лица виновным в изнасиловании. Жертва сексуального насилия может потребовать проведения обследования признанного виновным насильника. В связи с тем, что признание насильника виновным — если оно вообще имеет место — не происходит немедленно, обследование насильника может быть проведено спустя несколько месяцев после возможного заражения. Поэтому поиск информации о лице, совершившем изнасилование, — не лучший способ определить, заразились ли вы. Характер насилья, стадия заболевания, ваш собственный иммунитет и другие факторы делают результаты вашего собственного обследования более важными, чем результаты обследования насильника. Вам может помочь обсуждение ваших проблем с сотрудниками местной программы по борьбе с сексуальным насилием.

Коалиция противодействия сексуальному насилию штата Миннесота (Minnesota Coalition Against Sexual Assault)

161 St. Anthony Avenue, Suite 1001
St. Paul, MN 55103
(651) 209-9993
1-800-964-8847 (звонок бесплатный)
<http://www.mncasa.org>